

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTELOR CU RISC DE A CREA DEPENDENȚĂ	Ediția 1 2 3 4 Revizia 0 1 2 3 Exemplar nr.
	Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. FAR.02.	

PROCEDURA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTELOR CU RISC DE A CREA DEPENDENȚĂ

PG. FAR.02

**APROBAT,
manager**

Data: 29.09.2014



	Funcție	Nume si prenume	Semnătura	Data
Elaborat	Farmacist sef	Lazarescu Adina Maria		25.09.2014
Verificat	RMC	Dr. Budea Adina		29.09.2014

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTELOR CU RISC DE A CREA DEPENDENȚĂ	Editia 1 2 3 4 Revizia 0 1 2 3 Exemplar nr.
	Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. FAR.02.	

LISTĂ DE DIFUZARE

Ex. nr.	Ediție/ revizie	Difuzare			Observații
		Departament	Nume și prenume	Semnatura	
1.	1/0	Manager	Ing. Mitrut Diana		29.09.2014
2.	1/0	Director Medical	Dr. Lupu Cristian		29.09.2014
3	1/0	RMC	Dr. Budea Adina		29.09.2014
4	1/0	Farmacie	Far. Lazarescu Adina		29.09.2014
5	1/0	Asist. Coord.	Dragoș Viorica		29.09.2014
6	1/0	Sef sectie	Dr. Naghi Emil		29.09.2014
7	1/0	Sef sectie	Dr. Marina Felician		29.09.2014
8	1/0	Sef sectie	Dr. Lupu Dorin		29.09.2014
9	1/0	Sef sectie	Dr. Giuroescu Silviu		29.09.2014
10	1/0	Sef sectie	Dr. Giuroescu Rodica		29.09.2014
11	1/0	Sef comp.	Dr. Ursu Codruta		29.09.2014
12	1/0	Sef comp.	Dr. Damian Ildiko		29.09.2014

EVIDENȚA REVIZIILOR

Nr. Crt.	Ed/ Rev.	Pag.	Descriere continut, motivul reviziei, localizare	Data, semnatura persoanei care a efectuat revizia
1	1/0		Editare inițială pentru implementare și conformare la cerințele referențialelor SR EN ISO 9001:2008	

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTELOR CU RISC DE A CREA DEPENDENȚĂ	Ediția 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
	Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. FAR.02.	Exemplar nr.

1. SCOP

Prezenta procedură are drept scop modul de prescriere a analgezicelor opioide care pot provoca dependență.

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante și psihotrope

3. DOMENIU DE APLICARE

Procedura se aplică în toate secțiile și compartimentele spitalului, în special la nivelul compartimentului de îngrijiri paliative, secția obstetrică ginecologie, secțiile chirurgicale.

4. DESCRIEREA PROCEDURII

4.1 Clasificare:

ANALGEZICE OPIOIDE

Opioide naturale

- Morfina f. 20 mg
- Morfina + Atropină f. 20 mg morfină și 1 mg atropine
- Sevredol compr.10; 20 mg morfină
- MST CONTINUS compr.retard 10; 30; 60; 100; 200 mg morfină
- Dolatard compr.retard 10; 30,60; 100 mg

Opioide semisintetice

- Hidromorfon f. 2 mg
- Hidromorfon+ atropină f. 2 mg hidromorfon și 0,3 mg atropine
- Hidromorfon + scopolamină f. 2 mg hidromorfon și 0,3 mg scopolamine
- Oxycotin compr.elib.modif.10, 20, 40, 80 mg oxycodonă
- DHC CONTINUS compr. retard 60; 90; 120 mg dihidrocodeina

Compuși sintetici

- Mialgin f. 100 mg petidină clorh.
- Sintalgon compr.2,5 mg metadonă clorh.
- Dipidolor f. 15 mg pirtramida
- Fentanyl f. 0,5 mg fentanyl
- Darvon caps. 50 mg dextropropoxifen
- Tramal (Mabron) f.,sol.uz int,compr, sup. 50, 100 mg tramadol
- Fortral f. 30 mg, compr. 50 mg pentazocină
- Moradol f. 2 mg butorfanol
- Nubain f. 10 mg nalbufin

4.2 Analgezicele opioide sunt prescrise:

-în principal la pacienții cu dureri provocate de cancer în fază terminală

- prescripție pentru un bolnav cu dureri provocate de cancer în fază terminală.
- se poate prescrie morfină, stupefiant.
- doza pentru odată este de 10 mg, maximum 20 mg.
- doza maximă pe zi este de 60 mg, iar pe un formular, la începutul tratamentului se poate prescrie o cantitate pentru 3 zile (180 mg).
- ulterior, datorită instalării toleranței pentru efectul analgezic cantitatea va fi mai mare.

SPITALUL ORASENESC NEGRESTI OAS Str. Victoriei nr 90	PROCEDURA DE PRESCRIERE A MEDICAMENTELOR CU RISC DE A CREA DEPENDENȚĂ	Ediția 1 2 3 4
		Revizia 0 1 2 3
	Tip document: Procedura generala ; Cod document : PG. FAR.02.	Exemplar nr.

- există mai multe tipuri de preparate care conțin morfină., de ex. fiole cu 20 mg sau o combinație de morfină cu atropină.
- **atropina** are rolul de a atenua acțiunea deprimantă a morfinei asupra centrului respirator dar și de a combate spasmele musculaturii netede determinate de opioid.

-în dureri colicative, în edem pulmonar acut

- **petidina (Mialgin)**, un compus sintetic cu acțiune analgezică de cca 5 ori mai redusă decât a morfinei.
- se poate administra și în dureri colicative, de asemenea în edem pulmonar acut, combaterea frisoanelor. Nu se injectează subcutanat, deoarece injecția este foarte dureroasă. Atenție la injectarea intravenoasă, datorită pericolului deprimării centrului respirator

-în dureri moderat-severe, acute și cronice, inclusiv dureri neuropatice se poate prescrie **tramadol (Mabron, Tramal)**, un opioid sintetic cu mecanism de acțiune dual: opioid și de creștere a concentrației extraneuronale a noradrenalinei și serotoninei prin inhibarea recaptării acestor monoamine.. Are un potențial redus de deprimare a centrului respirator și de instalare a dependenței majore.

-în fazele incipiente ale durerilor canceroase sau pentru analgezia la naștere se poate folosi **pentazocina (Fortral)**, un opioid sintetic antagonist pe rec.miu și agonist pe rec.kappa, care nu produce euforie sau deprimarea respirației. Atenție! Poate induce sindrom de sevraj la morfinomani. Se preferă calea i.m. deoarece s.c. apar edem, indurație locală, atrofie cutanată.

Analgezicele opioidice indicate de către medicul curant sau șef de secție se vor trece în FOCG și în registrul de evidență a produselor stupefiante de la nivelul fiecărei secții.

Medicul curant și medicul șef de secție care indică analgezice opioidice, va semna și parafa în registrul de evidență a produselor stupefiante.

Medicul care indică analgezicele opioidice va menționa cu exactitate doza recomandată și durata tratamentului.

5.ANEXA

Registru de evidență a produselor stupefiante