

PROCEDURI DE PRELEVARI PENTRU EXAMENE DE LABORATOR

• RECOLTAREA SECREȚILOR CERVICO-VAGINALE

Recoltarea pentru examenul bacteriologic și parazitologic al secrețiilor vaginale

Scop: Depistarea de agenți patogeni care produc infecții vulvovaginale.

Materiale necesare:

- valve vaginale sterile sau specul – nelubrificate;
- tampoane de vată montate pe porttampon sterile;
- mănuși de unică folosință;
- eprubete cu mediu de cultură.

Pregătirea pacientului:

- nu se fac irigații vaginale cu cel puțin 24h înaintea procedurii;
- nu se folosesc ovule sau creme vaginale cu cel puțin 2 zile înainte;
- nu se administrează tratamente antiinfectioase cu cel puțin 8 zile înaintea prelevării;
- nu se face prelevare dacă există sângeare vaginală.

Efectuarea procedurii:

- se așează pacientă în poziție ginecologică pe masă;
 - se montează valvele sau speculul;
- Prima prelevare se face din fundul de sac vaginal posterior.
- se trimit imediat la laborator;

Recoltarea secrețiilor cervicovaginale pentru examenul citotumoral Babes-Papanicolau

Este un test complex utilizat pentru depistarea leziunilor necanceroase și a cancerelor incipiente cervicale la femeile asimptomaticice.

Indicații

- o dată pe an la femeile în varstă de peste 18 ani care au activitate sexuală;
- la femeile care nu prezintă leziuni cervicovaginale vizibile precum și la cele cu leziuni care evocă un proces inflamator sau distrofic la examenul clinic sau colposcopic.

Materiale necesare

- spatula de lemn Ayre (se evită spatulele de metal) pentru prelevarea vaginală și exocervicală;
- perie mică cilindrică pentru prelevarea endocervicală;
- tampon de vată montat pe un porttampon pentru recoltare endocervicală;
- lame de sticlă cu extremități aspre;
- fixator, alcool – eter în proporții egale;
- valve vaginale sau specul vaginal.

Pregătirea pacientei

- este avertizată să nu efectueze nici o manevră vaginală cu 72ore înaintea examenului (toaleta vaginală, aplicații de ovule, creme vaginale);
- se evită raporturile sexuale cu 24 ore înainte de recoltare;
- nu se efectuează manevre obstetricale cu 24ore înainte (tuseu vaginal, colposcopie, tamponamente vaginale etc.);
- prelevarea se face în afara menstruatiei, în afara infecției locale și de preferință în perioada de mijloc a ciclului.

Efectuarea procedurii

- se evidențiază cavitatea vaginală prin introducerea valvulelor sau speculului nelubrificate
- recoltarea se face de la mai multe niveluri:
- din fundul de sac vaginal;
- de la nivelul exocolului utilizând pentru ambele tehnici spatula Ayre efectuând o mișcare de raclaj;
- de la nivel endocervical utilizând peria cilindrică (mai rar tamponul care absoarbe unele celule);
- se fac lame pentru fiecare zonă din care s-a efectuat recoltarea;
- întinderea secreției pe lama se face printr-o miscare sinuoasă a spațiului, de la un capăt la celălalt fără a apăsa prea tare;
- la extremitățile lamelor se notează numele pacientei precum și tipul prelevării (V-vaginală, C-exocol, E-endocol);
- lamele se trimit la laborator.

Întocmit: Dr. Lupu Cristian - Director medical

Verificat: Dr. Budea Adina – Medic specialist epidemiolog

Aprobat: Mitruț Diana- Manager