

PROTOCOL DE ADMINISTRARE A MEDICAMENTELOR PE CALE RECTALA

Medicamentele care se administrează intrarectal sunt supozitoarele și unguentele. Supozitoarele sunt forme medicamentoase solide, de formă conică care au substanța activă înglobată într-o masă grăsoasă pe bază de unt de cacao sau glicerină. Se topesc la temperatura corpului și sunt absorbite lent.

Indicații și Contraindicații

Indicații:

- stimularea peristaltismului intestinal și al defecației;
- reducerea durerii, a inflamației și a iritațiilor locale;
- reducerea febrei și a simptomelor specifice unor aparate.

Contraindicații:

- pacienți cu tulburări de ritm întrucât introducerea supozitoarelor intrarectal stimulează nervul vag și determină aritmii;
- pacienți operați recent în zona rectului sau a prostatei;
- pacienți cu rectoragie.

Pregătirea materialelor

Se vor pregăti pe căruciorul de lucru:

- supozitoarele rectale, păstrate la frigider până în momentul administrării pentru a preveni înmuierea/topirea lor;
- mănuși de unică folosință;
- lubrifianț pentru supozitoare;
- unguentul cu un aplicator special;
- comprese de tifon/prosoape de hârtie;

Efectuarea procedurii

Reguli generale:

- se verifică corespondența între medicația prescrisă de medic și cea eliberată de farmacie;
- se verifică calitatea și integritatea supozitoarelor, tuburilor cu unguente, termenul de valabilitate;
- se spală mâinile;
- se identifică pacientul și se asigură intimitatea acestora.

Administrarea supozitoarelor


- se așează pacientul în poziția SIMS (decubit lateral stâng cu membrul inferior stâng întins și membrul inferior drept flectat);

- se acoperă pacientul expunându-i doar zona fesieră;
 - se îmbracă mănușa de cauciuc în mâna dominantă;
 - se scoate supozitorul din ambalaj și se lubrifiază vârful la nevoie;
 - se îndepărtează fesele cu mâna nedominantă pentru a evidenția zona anală;
 - se cere pacientului să inspire profund pe gură în timpul inserției supozitorului pentru a inhiba senzația de defecație și a reduce disconfortul;
 - se introduce supozitorul prin anus cu vârful conic și cu mâna protejată de mănușă;
 - se împinge supozitorul până trece de sfincterul anal intern, aproximativ 6 cm;
 - se curăță zona anală cu șervețele de hârtie;
 - se îndepărtează mănușa;
 - se solicită pacientului să rămână în aceeași poziție și să încerce să țină cât mai mult supozitorul pentru a-și face efectul (un supozitor administrat pentru stimularea defecației trebuie reținut cel puțin 20 minute pentru a-și face efectul);
 - dacă este cazul, se exercită presiune pe anus cu o compresă, până când senzația de defecație dispăre;
 - se aruncă materialele consumate în recipientul pentru deșeuri;
- se învață pacientul și/sau familia procedura de introduce a supozitoarelor dacă administrarea acestora trebuie continuată și după externare;
- se notează procedura în fișa de proceduri.

Întocmit: Dr. Lupu Cristian - Director medical

Verificat: Dr. Budea Adina – Medic specialist epidemiolog

Aprobat: Mitruț Diana- Manager



DR. BUDEA ADINA
Medic specialist
epidemiologie
cod B77934