

**SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI OAŞ**  
Jud. Satu Mare – Localitatea Negrești Oaș, str. Victoriei nr.90  
Telefon: 0261854830, Fax: 0261854566  
e-mail: [spitalnegrestioas@yahoo.com](mailto:spitalnegrestioas@yahoo.com)

**PROTOCOL PENTRU ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE CALE PARENTERALA- INJECTIA INTRAMUSCULARA**

**Scop**

Introducerea unei soluții medicamentoase în țesutul muscular cu ajutor unei seringi și a unui ac steril.

**Pregătirea materialelor**

- seringi sterile de capacitate corespunzătoare volumului de injectat;
- ace sterile etalon de 19-22 mm. grosime, lungi de 5-10 cm.;
- soluții antiseptice;
- comprese de tifon / tampoane de vată;
- mănuși de unică folosință (optional);
- tăvă renală;
- containere speciale pentru colectarea materialelor.

**Pregătirea pacientului**

- se intervinează pacientul pentru a identifica un posibil risc de alergie;
- se obține consumământul informat;
- se asigură intimitatea pacientului;
- se stabilește locul pentru injecție după inspectarea zonelor de elecție;
- se poziționează pacientul în funcție locul ales și de starea sa generală.

**Efectuarea procedurii**

- se spală mâinile;
- se montează acul la seringă folosind tehnica aseptică;
- se îndepărtează capacul acului prin tracțiune;
- se scoate aerul;
- se dezinfectează locul ales;
- se întinde pielea folosind mâna nedominantă;
- se introduce rapid acul în țesut în unghi de 90° ținând seringa în mâna dominantă între police și celelalte degete;
- se fixează amboul seringii între policele și indexul mâinii nedominante;
- se aspiră încet trăgând pistonul înapoi cu mâna dominantă pentru a verifica poziția acului;
- se schimbă poziția acului dacă se aspiră sânge;
- se injectează lent soluția în țesutul muscular, câte 10 secunde pentru fiecare ml soluție;
- se extrage rapid acul adaptat la seringă fixând amboul;
- se aruncă acul necapișonat în container;
- se masează locul injecției cu un tampon cu alcool exercitând o ușoară presiune;
- se ajută pacientul să se îmbrace, să adopte o poziție comodă;
- se evaluează locul injecției după 2-4 ore de la administrare, dacă este posibil;
- se reorganizează locul de muncă;
- se spală mâinile;
- se notează procedura în Fișa de proceduri (nume, data și ora administrării, tipul soluției, doza).

Întocmit: Dr. Lupu Cristian - Director medical

Verificat: Dr. Budea Adina – Medic specialist epidemiologie

Aprobat: Mitruț Diana- Manager

**DR. BUDA ADINA**  
Medic specialist  
Epidemiologie  
cod 877934