

Protocol de tratament al statusului epilepticus la adulti

Definitie OMS : SE este o stare caracterizata printr-o criza de epilepsie care persista suficient de mult sau care se repeta la intervale suficient de scurte pentru a crea o conditie fixa si durabila (3 crize repetate fara interval liber intre ele).

Masuri generale

Stadiul 1 (0 -10 minute)

- Asigurarea libertatii cailor aeriene
- Administrarea de oxigen
- Evaluarea cardio - respiratorie
- Abord venos periferic
- Monitorizare (TA , ECG, SpO₂)

Debut de status epilepticus

Stadiul 2 (0 -30 minute)

SE

- Tratament medicamentos antiepileptic injectabil: diazepam 10 – 20 mg (0,2 mg /kgc), se continua tratamentul sau de baza (daca are)
- In suspiciunea de alcoolism : Thiamina 250 mg i.v. urmata de glucoza 33 %, 8 fiole i.v.
- Continuarea tratamentului cu Fenitoin 18 mg/kgc SA in 30 - 60 de minute, daca se reiau crizele
- Gaze sanguine: tratamentul acidozei - bicarbonat de sodiu

Stadiul 3 (0 -60 minute)

Status refractor

- Diagnostic etiologic
 - In lipsa raspunsului : consult ATI,
- Continuarea tratamentului cu anestezie generala (Tiopenthal, Propofol, curare , IOT, ventilatie mecanica) : 12 – 24 de ore de la ultima criza convulsiva clinmica sau EEG..

Monitorizare EEG

Probe biologice : glicemie , uree, creatinina, probe hepatice, ionograma serica (inclusiv Ca si Mg), timp de coagulare, hemograma.

SPITALUL ORĂŞENESC NEGREŞTI OAŞ
Jud. Satu Mare – Localitatea Negreşti Oaş, str. Victoriei nr.90
Telefon: 0261854830, Fax: 0261854566
e-mail: spitalnegrestioas@yahoo.com

Intocmit: Dr. Lupu Cristian –director medical

Verificat: Dr. Lupu Cristian –director medical

Aprobat: Ing. Mitrut Diana –manager

